

Редуксин® Форте (Reduxin Forte)

Один из самых эффективных препаратов, помогающих справиться с аппетитом. В состав Редуксина форте, входят сибутрамин и метформин. Эти два препарата прекрасно дополняют друг друга.

Сибутрамин - уменьшает аппетит и количество потребляемой пищи (усиливает чувство насыщения), увеличивает термогенез и расход энергии, оказывает влияние на бурую жировую ткань.

Метформин - задерживает всасывание углеводов в кишечнике и стимулирует выработку ГПП-1 (физиологический регулятор аппетита). Кроме того, метформин оказывает благоприятный эффект на метаболизм липидов: снижает содержание общего холестерина, триглицеридов.

Одновременное применение метформина и сибутрамина повышает эффективность терапии у пациентов с избыточным весом.

Посредством регуляции аппетита, снижения чувства голода, повышения расхода энергии и регуляции липидного и углеводного обменов Редуксин® Форте уменьшает массу тела человека и восстанавливает метаболический баланс.

Редуксин® Форте (Reduxin Forte) - назначается только врачом, так как есть некоторые ограничения в приеме препаратов, которые входят в состав редуксина форте. Так, Метформин – не назначают при признаках любой гипоксии у пациента (сердечная недостаточность, низкий гемоглобин и т.д), а Сибутрамин - не назначают у пациентов с гипертонией, выраженным атеросклерозом.

Показания к применению

Препарат Редуксин® Форте показан для коррекции массы тела и улучшения липидного и углеводного обмена у пациентов: с ИМТ >30 кг/м² (алиментарное ожирение); ИМТ ≥27 кг/м² в сочетании с сахарным диабетом типа 2 и дислипидемией; ИМТ ≥30 кг/м² с предиабетом и дополнительными факторами риска развития сахарного диабета типа 2, у которых изменения образа жизни не позволили достичь адекватного гликемического контроля.

Перечень противопоказаний хорошо представлен в официальной инструкции.

Хочу обратить внимание на возможные состояние, ограничивающие применение Редуксин® Форте:

- на аритмию в анамнезе;
- хроническая недостаточность кровообращения;
- заболевания коронарных артерий (в т.ч. в анамнезе), кроме ишемической болезни сердца (инфаркт миокарта, стенокардия);
- глаукома, кроме закрытоугольной глаукомы; холелитиаз; артериальная гипертензия (контролируемая и в анамнезе);



- нарушение свертываемости крови; применение препаратов, влияющих на гемостаз или функцию тромбоцитов;
- возраст старше 60 лет.

Прием препарата осуществляется 1 раз в сутки в утренние часы. Дозу устанавливают индивидуально в зависимости от переносимости и клинической эффективности. Рекомендуется начальная доза (850+10) мг/сут.

Препарат следует принимать утром, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости (стакан воды). Препарат можно как принимать натощак, так и сочетать с приемом пищи. Увеличение дозы до (850+15) мг возможно, если в течение месяца не достигнуто снижение массы тела на 2 кг и более, но не ранее чем через 4 нед от начала лечения.

Лечение препаратом Редуксин® Форте не должно продолжаться более 3 мес у пациентов, которым в течение 3 мес лечения не удается достигнуть 5% уровня снижения массы тела от исходного уровня при приеме препарата в максимальной дозе. У пациентов с ожирением без дополнительных нарушений углеводного обмена рекомендован прием препарата Редуксин® Форте в течение 6 месяцев для выработки правильных привычек питания и удержания достигнутого результата по снижению массы тела. Лечение препаратом Редуксин® Форте не следует продолжать, если при дальнейшей терапии после достигнутого снижения массы тела, пациент вновь прибавляет в массу тела 3 кг и более.

Рекомендуется длительный прием препарата для снижения массы тела на 5–10% и удержания результата, что позволяет уменьшить риски для здоровья, а также улучшить течение заболеваний, ассоциированных с ожирением.

Лечение препаратом Редуксин® Форте должно осуществляться в комплексе с диетой и физическими упражнениями под контролем врача, имеющего практический опыт лечения ожирения.

Длительность непрерывного лечения не должна превышать 1 года. (ссылка на статью по снижению веса)